

RCT-Rits: En placebokontrollerad studie för personer med psykossjukdom

Bakgrund: På senare år har forskare visat att det finns ett samband mellan autoimmuna sjukdomar och psykossjukdomar. **En inflammation i hjärnan kan orsaka hörsel- och synhallucinationer, olust, orkeslöshet och vanföreställningar.** I en liten studie med nio patienter har vi visat att *Rituximab* kan förbättra psykossymtom och förbättra samspelet i hjärnans nätverk.

Rituximab verkar genom att minska inflammation.

Behandlingen: Ett dropp med **Rituximab (eller koksalt) ges vid ett tillfälle.** Droppbehandlingen tar cirka 4 timmar och efter behandlingen får man åka hem.


Uppföljning: Deltagarna följs under **6 månaders tid**, med två längre besök (1-2 timmar) och 2 korta samtal.

I denna forskningsstudie ska effekten av **rituximab jämföras med effekten av placebo (koksalt) på psykossymtom.** Rituximab är en tilläggsbehandling och ersätter inte antipsykotiska mediciner. Deltagarna fortsätter därför med sina ordinarie mediciner under studiens gång.

Studien är dubbelblindad, dvs varken patient eller behandlare vet om deltagaren får en rituximab- eller placebobehandling.

En kvinna med psykossjukdom har behandlats med rituximab och förbättrats påtagligt. Hon berättade för SVT Örebro se nedan.

”helt plötsligt får man tillbaka ett liv”



Personer mellan 18 och 55 år som har en psykossjukdom sedan mer än 1 år, och som **inte mår helt bra, kan delta i studien.**

Den som har Leponexbehandling kan däremot inte delta eftersom kombinationen är olämplig.

Om rituximab:

- Rituximab har funnits i 25 år och är en standardbehandling för bla. MS.
- Rituximab ges som dropp.
- Cirka 10 000 svenskar behandlas idag med rituximab.
- **Rituximab anses som ett säkert läkemedel**

- **Kontakt:** Om ni vill veta mer om studien kontakta oss via e-post: RCT-Rits@oru.se
- **Ansvarig läkare för studien** är Dr Susanne Bejerot

Mål: I framtiden hoppas vi att personer med psykossjukdom ska få lika goda behandlingsmöjligheter som idag erbjuds patienter med ledgångsreumatism och MS. Vi hoppas också att studien ska minska fördomar och skam som ofta drabbar personer med psykos.

Studien stöds av

- Vetenskapsrådet
- Torsten Söderbergs stiftelse
- Hjärnfonden
- Intresseföreningen Sane & Intresseföreningen för schizofreni

Om du vill veta mer om RCT-Rits kan du läsa om den på studiens hemsida via denna QR-kod

